

BIJLAGE 1 – BELANGRIJKE ZOÖNOSEN IN DE PLUIMVEEHOUDERIJ

Zoönose	Verschijselen bij het dier	Overdracht	Verschijselen bij de mens	Preventie
Erysipeloid (visroos of wondroos)	Vlekziekte; verhoogde uitval tot sterfte Eerste verschijnselen binnen twee tot vijf dagen	Diercontact bij dragers en zieke dieren, vochtige grond, water, voer, ongedierte en wilde vogels	Huidafwijkingen die vergezeld kunnen gaan met gewrichtsklachten	Vermijd contact; dierproducten, uitwerpselen, vruchtwater besmette dieren PBM als adembescherming, handschoenen, beschermende kleding en hoge rubberen laarzen. Let op: Specifieke risico's bij zwangerschap, contact vermijden.
Vogelgriep (Aviaire influenza) H5N1 of H7N7	Symptoomvrij tot ziekteverschijnselen en snelle sterfte Lichte afname voedselopname, abnormale vochtophoping kop en nek, diarree, luchtwegproblemen, terugval eierproductie etc.	Direct diercontact, luchtverspreiding of besmet materiaal als mest Laagpathogene aviaire influenza (LPAI) of Hoogpathogene aviaire influenza (HPAI)	Hoge koorts, hoesten, hoofdpijn, keelpijn, longontsteking en tot het uitvallen van functie van bepaalde organen.	Vaccin voor pluimvee zelf Hygiënische maatregelen PBM als adembescherming, handschoenen, beschermende kleding en hoge rubberen laarzen
Vogel-tuberculose (bacterie Mycobacterium avium)		Voedsel, Inhalatie deeltjes van faeces	Onwel, koortsaanvallen, nachtelijk zweten, gezwollen (lymfe) klieren, vermoeidheid, darmkramp, diarree en gewichtsverlies	PBM als adembescherming, handschoenen, beschermende kleding en hoge rubberen laarzen