



## Bijlage 1 Belangrijke zoönosen voor het Mechanisch Loonwerk

Zoönose	Waar/ Wanneer	Verschijselen bij de mens	Maatregelen	Meer informatie
Lyme-ziekte door tekenbeet	<ul style="list-style-type: none"><li>In het groen, bos, natuur en tuinen</li><li>Bij contacten met dieren</li><li>Het gehele jaar maar vooral tussen maart en november</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Rode groter wordende plek op de huid</li><li>Griepachtige verschijnselen</li><li>Gewrichtsklachten</li><li>Hart- en zenuwenklachten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Beschermende kleding dragen conform gemaakte afspraken (bedekkend en sluitend)</li><li>Insectenwerende middelen gebruiken</li><li>Dagelijks controleren (de huid en de kleding)</li><li>Teken zo snel mogelijk verwijderen met speciaal pincet</li><li>Registreren</li><li>Bij groter wordende rode plek of griepachtige klachten naar huisarts</li></ul>	<p><a href="#">Week van de teek</a> <a href="#">RIVM</a> <a href="#">Nederlands Huisartsen Genootschap</a> <a href="#">Bijlage 2</a></p>
Insectenbeten bijv. van bijen, wespen, hommels	<ul style="list-style-type: none"><li>Overall in Bos, Natuur en in het groen</li><li>Let op grondnesten van wespen en hommels</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Jeuk, pijn en zwelling</li><li>Maar ook ernstige allergische reacties zoals flauwvallen, duizeligheid, misselijkheid moeilijkheden bij slikken of ademen of in shock raken.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Beschermende kleding (lange mouwen en lange broek zo min mogelijk huid bloot laten) en insectenwerende middelen gebruiken (vacuümpompje voor insecten In EHBO-doos).</li><li>Zorg voor een noodset voor personen die sterk allergisch reageren.</li><li>Vermijd sterke geuren als parfum en deodorants.</li><li>De angel van een bij verwijderen</li><li>Contact met de huisarts of EHBO van het ziekenhuis bij: gestoken in de mond tong of keel, bij overgevoeligheid, benauwdheid, zwelling oogleden of lippen</li></ul>	<p><a href="#">patiëntenfolder NHG</a> <a href="#">Bijlage 3</a></p>

Zoönose	Waar/ Wanneer	Verschijnselen bij de mens	Maatregelen	Meer informatie
<p>Q-koorts door contact met besmette dieren: o.a. schaap, geit, rund of de mest van besmette dieren</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Via opwaaiend stof in de omgeving van de besmette stallen of waternevel</li> <li>Besmette mest, ruwe wol</li> <li>Zie de waarschuwborden bij de bedrijven</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Griep</li> <li>Long-, lever- en hartklepontsteking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inademen van besmet stof vermijden</li> <li>Mondkapje, bril, beschermende kleding, eventueel laarzen</li> <li>Voorlichting geven en bij klachten naar de huisarts</li> <li>Kijk voor besmette omgeving op de site van het RIVM.</li> </ul>	<p><a href="#">Stigas</a> of <a href="#">Stigas-folder</a> <a href="#">RIVM</a> <a href="#">KIZA</a></p>
<p>Eikenprocessierups Brandharen van de rups (ook de rupsen van de bastaard satijn vlinder kunnen sterk irriteren)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In eikenbomen met de rups</li> <li>In de periode mei – september</li> <li>Soms ook in grondnesten onderaan de stam.</li> <li>Brandharen kunnen ook op de grond terecht komen Tijdens het maaien op opruimen kunnen ze voor problemen zorgen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hevige jeuk</li> <li>Oogklachten</li> <li>Klachten aan de luchtwegen</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Signaleren naar de eigenaar of gemeente</li> <li>Voorkomen van blootstelling</li> <li>Draag bij het verwijderen van eikenprocessierupsen goed sluitende overall met capuchon, volgelaatsmasker met FFP2 filter, bril, handschoenen en laarzen en tape de mouwen en broekspijpen dicht.</li> <li>Bij klachten niet krabben / wrijven</li> <li>Was de huid, spoel de ogen.</li> <li>Aanwezige brand haren met strippen plakband verwijderen</li> </ul>	<p><a href="#">Stigas</a> <a href="#">RIVM</a> <a href="#">KIZA</a></p>
<p>Tetanus (via wondje waar stof of vuil in komt)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij contact met straatvuil</li> <li>Bij verwonding</li> <li>Bij beet van dieren</li> <li>Mest van dieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tetanus. De ziekte begint met niet-specifieke klachten zoals hoofdpijn en spierstijfheid in de kaken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actieve immunisatie (aan te bevelen opnieuw in enten na 15 jaar)</li> <li>Zorg voor een goede wondhygiëne en wond behandeling</li> <li>Bij verwonding contact opnemen met de huisarts</li> </ul>	<p><a href="#">KIZA</a> <a href="#">RIVM</a></p>

Zoönose	Waar/ Wanneer	Verschuinselen bij de mens	Maatregelen	Meer informatie
Hepatitis B (door in aanraking te komen met voorwerpen met besmet bloed (injectienaalden))	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact met bloed verontreinigd materiaal of instrumentarium (naalden drugsgebruikers)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De symptomatische infectie begint geleidelijk aan met algemene verschuinselen zoals moeheid, malaise, griepig gevoel, koorts en slechte eetlust.</li> <li>Bij een minderheid zijn er ook spier- en gewrichtsklachten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inenting hepatitis B-vaccinatie</li> <li>Draag ondoordringbare handschoenen en schoeisel met stalen zolen (S3 of S5) bij het opruimen van zwerfvuil.</li> <li>Bij verwonding contact opnemen met de huisarts.</li> </ul>	<a href="#">KIZA</a> <a href="#">RIVM</a>
Ziekte van Weil/ of leptospirose	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kan ontstaan door contact met oppervlaktewater besmet met urine van ratten, dode dieren of uitwerpselen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De ziekte begint met een plotselinge hoge koorts van 39 tot 40 graden Celsius.</li> <li>Symptomen kunnen zijn: koude rillingen, hoge koorts, rode ogen, buikpijn, braken en spierpijn in de kuiten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventie bij de mens is vooral gericht op het voorkómen van contact met besmette dieren en de besmette omgeving (riolen, sloten, grachten, e.d.), bijvoorbeeld door het dragen van rubberlaarzen en handschoenen door werkers in besmette gebieden</li> </ul>	<a href="#">KIZA</a> <a href="#">RIVM</a>
Hondsdolheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Speeksel van besmette zoogdieren (o.a. honden, katten en vleermuizen en vossen) O.a. bij <ul style="list-style-type: none"> <li>sloopwerkzaamheden</li> <li>onder rietendaken</li> <li>bij contact met besmette dieren</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Griepverschijn-selen en abnormale gevoelens in het gebeten lichaamsdeel</li> <li>Uiteindelijk tast het de hersenen aan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na beet van hond, kat of vleermuis direct naar de huisarts/of EHBO</li> </ul>	<a href="#">CVI Lelystad</a>
Papegaaienziekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kan ontstaan door het inademen van de bacterie bijv. bij contact met : Vogelpoep, vogelkastjes, vogelkooien, oud karkas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichte verkoudheid, griepverschijn-selen , ernstige longontsteking, leverproblemen of ontstekingen aan de hartspier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij (schoonmaak)werkzaamheden: zorg voor goede ventilatie, draag adembescherming, rubberhandschoenen, draag een beschermende overall. Neem algemene hygiëne maatregelen in acht.</li> </ul>	<a href="#">KIZA</a> <a href="#">RIVM</a>

Zoönose	Waar/ Wanneer	Verschijnselen bij de mens	Maatregelen	Meer informatie
Vossenlintworm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij materialen met ontlasting van vos, hond, kat</li> <li>• Kan ook aan schoen of bijvoorbeeld de maaimachine zitten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buikpijn, kortademigheid, geelzucht, infecties in inwendige organen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contact met vossen voorkomen, alleen met handschoenen aanraken/beetpakken</li> <li>• Geen bosvruchten of valfruit eten</li> <li>• Regelmatig handen wassen</li> </ul>	<p><a href="#">KIZA</a> <a href="#">RIVM</a></p>